

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de la Côte-Nord

Québec



## Portrait de santé des résidents de Caniapiscau

*Direction de santé publique*

**Juillet 2018**

communauté

Hommes

réseau

Humain

Femmes

âinés

services

région

côte-nord

société

santé

sociaux

Famille

vie

Gens

enfants

milieu


# Table des matières

1. Conditions démographiques.....	1
2. Conditions socioculturelles .....	4
3. Données socioéconomiques .....	9
4. Environnement physique .....	11
• Qualité de l'eau .....	11
5. Habitudes de vie, facteurs de risque et comportements préventifs.....	13
• Facteurs de risque à la naissance .....	13
• Habitudes de vie : Alcool et tabagisme .....	14
• Habitudes de vie : activité physique.....	15
• Approche École en santé.....	17
6. État de santé global.....	18
7. État de santé physique .....	19
• Prévalence et incidence des problèmes de santé .....	19
• Mortalité selon les principales causes .....	35
• Années potentielles de vie perdues à 75 ans .....	36
• Hospitalisation et mortalité pour traumatismes non intentionnels.....	37

# Portrait de santé des résidents de la Caniapiscau

## 1. Conditions démographiques

Population du RLS de Caniapiscau et de la Côte-Nord au 1<sup>er</sup> juillet 2018  
(n)




**Source(s) de données :**

- Institut de la statistique du Québec (ISQ). Estimations et projections de population comparables, selon le territoire, le sexe et les groupes d'âge spécifiques, au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2036; Diffusion : MSSS, (DGI).

### Faits saillants

- En 2018, le RLS de Caniapiscau compte 3 793 habitants (4 % de la région). Les jeunes de 0 à 17 ans représentent environ un habitant sur quatre (27 %). Les personnes âgées de 18 à 64 ans sont les plus nombreuses, elles représentent 70 % de la population de ce RLS. De leur côté, les personnes âgées de 65 ans et plus comptent pour 4 % des résidents.
- Durant la période 2006 à 2018, la population du RLS de Caniapiscau a augmenté d'environ 11 %, passant de 3 422 à 3 793 habitants (données non présentées). Ce sont chez les personnes âgées de 65 ans et plus que l'on peut observer l'augmentation la plus marquée avec 106 % (67 à 138 personnes), suivies par les jeunes de 0 à 17 ans (21 %, 839 à 1 017 jeunes) et les personnes âgées de 18 à 64 ans (5 %, 2 516 à 2 638 personnes) (données non présentées).
- En Côte-Nord, entre 2006 et 2018, on note une diminution globale d'un peu plus de 1 % (96 569 à 95 217). Chez les jeunes de 0-17 ans, cette diminution est de 13 % (21 034 à 18 309 jeunes) et chez les personnes âgées de 18 à 64 ans, elle est de 7 % (64 225 à 59 532 personnes) (données non présentées). Cependant, on remarque chez les personnes âgées de 65 ans et plus un accroissement de 54 % (11 310 à 17 376 personnes) (données non présentées).

## Évolution populationnelle du RLS de Caniapiscou du 1<sup>er</sup> juillet 2018 au 1<sup>er</sup> juillet 2036 (n)




### Source(s) de données :

- Institut de la statistique du Québec (ISQ). Estimations et projections de population comparables, selon le territoire, le sexe et les groupes d'âge spécifiques, au 1<sup>er</sup> juillet, 1996 à 2036; Diffusion : MSSS, (DGI).

### Faits saillants

- Selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, la population du RLS de Caniapiscou diminuera d'environ 1 % durant la période 2018 à 2036 (3 793 à 3 754 habitants). De son côté, la population nord-côtière diminuera de 2 % (95 217 à 93 060 habitants) (données non présentées).
- Dans ce RLS, entre 2018 et 2036, la population des 65 ans et plus augmentera de 30 % (138 à 180 habitants). Le groupe des 18 à 64 ans diminuera de 3 % (2 638 à 2 562 habitants) et la population des 0 à 17 ans restera stable (1 017 à 1 012 jeunes).

**Taux de natalité et âge moyen et médian des mères, 2010-2014**  
**RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec**  
**(Taux annuel moyen pour 1 000 femmes et âge moyen et médian en année)**



(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(-) : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑ : Valeur significativement plus élevée que celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %.

**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.

- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mai 2017).


Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Dans le RLS de Caniapiscau, le taux de natalité est statistiquement supérieur à celui du reste de la Côte-Nord et du Québec (16 c. 11 et 11 pour 1 000 personnes).
- L'âge moyen et médian des mères du RLS de Caniapiscau et de la Côte-Nord est significativement moins élevé que celui des mères du reste Québec (RLS Caniapiscau : 28 ans et 28 ans, Côte-Nord : 28 ans et 28 ans et reste du Québec : 30 ans et 30 ans).

## 2. Conditions socioculturelles

Proportion de la population anglophone<sup>1</sup> et autochtone<sup>2</sup>, 2011  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(%)



**Source(s) de données :**

- Population selon le critère de la langue maternelle; Région Côte-Nord, territoire de CSSS de résidence, projection de 2015 sur la base des données corrigées du recensement de 2011. Statistique Canada.
- Enquête nationale sur les ménages. 2011. Statistique Canada.


### Faits saillants

- En 2011, la population anglophone, selon le critère de la langue maternelle, représente 3 % (105 personnes) de la population du RLS de Caniapiscau (Côte-Nord : 5 %, 4 538 personnes et Québec : 9 %, 674 545 personnes).
- 19 % des résidents du RLS de Caniapiscau (700 personnes) se déclarent une identité autochtone (Côte-Nord : 16 %, 14 675 personnes et Québec : 4 %, 307 445 personnes).

<sup>1</sup> Selon la population de langue maternelle anglaise et la moitié de la population de langue maternelle anglaise et française.

<sup>2</sup> Population se déclarant une identité autochtone.

## Répartition de la population (18 ans et plus) selon l'état matrimonial de fait, 2011 RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec (%)




### Source(s) de données :

- Statistique Canada. Recensement de 2011, Tableau de données géocodées 02 pour le Québec, les RSS, les RLS et les CLSC : Population totale selon le sexe (3), les groupes d'âge (20), l'état matrimonial (8), le type de ménage (6) montrant la langue parlée le plus souvent à la maison (10) et la langue maternelle (10)
  - Données intégrales (100 %), novembre 2013.
- Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

### Faits saillants

- Les habitants du RLS de Caniapiscau ont tendance à vivre en union libre en plus grand nombre que dans le reste de la Côte-Nord et du Québec (38 % c. 28 % et 22 %). De surcroît, la population de ce territoire semble se marier légèrement moins que dans le reste de la région et de la province (28 % c. 34 % et 37 %).

**Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans  
selon la structure de la famille, 2011  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(%)**




**Source(s) de données :**

- Statistique Canada. Recensement de 2011, Tableau de données géocodées 03 pour le Québec, les RSS, les RLS et les CLSC : Familles de recensement dans les ménages privés selon les groupes d'âge des enfants à la maison (25) et la structure de la famille de recensement (7)
  - Données intégrales (100 %), novembre 2013.
- Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Les familles de couples en union libre avec enfants de moins de 18 ans semblent un peu plus élevées dans le territoire de Caniapiscau que sur la Côte-Nord et au Québec (57 % c. 48 % et 35 %), tandis que les familles de couples mariés avec enfants de moins de 18 ans semblent moins nombreuses que dans la province (23 % c. 40 %).

**Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule  
selon le grande d'âge, 2011  
RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec  
(%)**



**Source(s) de données :**


- Statistique Canada. Recensement de 2011, Tableau de données géocodées 04 pour le Québec, les RSS, les RLS et les CLSC : Population totale selon le sexe (3), les groupes d'âge (20) et la modalité de vie (19)
- Données intégrales (100 %), novembre 2013.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Dans l'ensemble des catégories d'âges, sauf chez les 75 ans et plus, la population du territoire de Caniapiscou se compare à la population nord-côtière et du Québec quant au fait de vivre seule (voir figure).
- Dans le RLS de Caniapiscou, sur la Côte-Nord et dans l'ensemble du Québec, on constate que plus la population avance en âge, plus les personnes ont tendance à vivre seules (voir figure).

**Nombre d'élèves au préscolaire, primaire, préscolaire/primaire et secondaire, 2015**  
**Commission scolaire du Fer**  
**(RLS de Port-Cartier/Sept-Îles/Caniapiscau) et Côte-Nord**  
**(n et %)**



**Source(s) de données :**


- Les commissions scolaires de la Côte-Nord. Janvier 2015.

**Faits saillants**

- En janvier 2015, on recensait 4 387 élèves inscrits dans la Commission scolaire du Fer. Ce nombre représente 40 % des élèves de la Côte-Nord.
- On retrouve la très grande majorité des élèves dans les commissions scolaires du Fer et de l'Estuaire (80 %, 8 738 élèves).

### 3. Données socioéconomiques

**Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (2011),  
proportion des familles avec enfants de moins de 18 ans  
vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (2011)  
et la population sans diplôme d'études secondaires chez les 15 ans et plus (2011)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(%)**



<sup>aa</sup> n.p. Taux global de non-réponse supérieur ou égal à 25 % et inférieur à 50 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence puisque le risque de biais augmente plus le taux global de non-réponse est élevé.


**Source(s) de données :**

- Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, Tableau de données géocodées 06 pour le Québec, les RSS et les territoires de CLSC : Population dans les ménages privés selon le groupe d'âge (15), le sexe (3) et le seuil de faible revenu (28), juillet 2015 (produit électronique).
  - Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, Tableau de données géocodées 07 pour le Québec, les RSS et les territoires de CLSC : Familles de recensement dans les ménages privés avec enfant(s) de moins de 18 ans selon la structure de la famille (3) et le seuil de faible revenu (28), juillet 2015 (produit électronique).
  - Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, Profil semi-personnalisé - Immigration et diversité ethnoculturelle, peuples autochtones, scolarité et travail, mobilité et migration, et revenu et logement, juillet 2015.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

#### Faits saillants

- La proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt et la proportion des familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu après impôt dans le RLS de Caniapiscau sont trop imprécises pour être analysées.
- En 2011, la proportion de la population âgée de 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires dans le RLS de Caniapiscau est de 23 % (Côte-Nord : 32 % et Québec : 22 %).
- Près d'une personne sur cinq (18 %) déclare un niveau de scolarité qui équivaut tout au plus à un 5<sup>e</sup> secondaire (Côte-Nord : 20 % et Québec : 22 %). Pour 49 % des personnes du même groupe d'âge, le diplôme le plus élevé correspond à un certificat ou diplôme d'études postsecondaires (39 % sur la Côte-Nord et 37 % au Québec). Enfin, 10 % de la population du RLS de Caniapiscau détient, en 2011, un grade universitaire (baccalauréat ou grades supérieurs, c'est-à-dire maîtrise ou doctorat) comparativement à 19 % de la population québécoise et à 9 % pour celle de la Côte-Nord.

### Répartition de la population par quintile de défavorisation matérielle et sociale<sup>3</sup> (variation régionale<sup>4</sup>, 2011, RLS de Caniapiscou (%))



Source(s) de données :

- Statistique Canada. Recensement et Enquête nationale des ménages, 2011.

### Faits saillants

- Dans le RLS de Caniapiscou, 84 % des résidents habitent dans des aires de diffusion favorables (Q2) et plus favorables (Q1) au plan matériel. Cette proportion est de 16 % pour les personnes vivant dans des aires matériellement plus défavorables (Q5).
- Au plan social, plus d'une personne sur deux habite dans des aires de diffusion favorables (Q2) et plus favorables (Q1) (55 %), 29 % dans des moyennes (Q3) et 16 % vivent dans des aires plus défavorables (Q5).


<sup>3</sup> L'indice de défavorisation matériel est fondé sur les indicateurs suivants : proportion des personnes de 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires, le ratio emploi-population chez les personnes de 15 ans et plus, le revenu moyen des individus de 15 ans et plus. L'indice de défavorisation sociale est construit à partir du pourcentage de personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leur domicile, du pourcentage de personnes de 15 ans et plus séparées, divorcées ou veuves et, finalement, de la proportion de familles monoparentales.

<sup>4</sup> Selon le calibrage régional.

## 4. Environnement physique

### Qualité de l'eau

**Nombre de déclarations hors normes de contaminants dans l'eau potable, ensemble des contaminants<sup>5</sup>, 2005 à 2015**  
**RLS de Caniapiscou et Côte-Nord**  
**(n)**



**Source(s) de données :**


- Système « Eau potable », ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).  
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

### Faits saillants

- Le nombre le plus élevé de déclarations enregistré dans le RLS de Caniapiscou pour de l'eau potable contaminée est de 12 déclarations en 2014 (Côte-Nord : 414 déclarations en 2005). Le plus faible nombre est de 2 déclarations en 2009 et 2015 (Côte-Nord : 92 déclarations en 2008).
- Dans le RLS de Caniapiscou, la moyenne des déclarations pour de l'eau potable contaminée entre 2005 et 2015 se chiffre à 7 déclarations par année (Côte-Nord : moyenne de 199 déclarations par année).

<sup>5</sup> Contaminants : Acide trichloroacétique, bactéries hétérotrophes (35 c), benzo (a) pyrène, chloramines, coliformes fécaux, coliformes totaux, cuivre, dichlorobenzène (1,4), escherichia coli, mercure, ph, plomb, trihalométhanes et turbidité.

**Nombre d'avis d'ébullition de l'eau potable par contamination microbiologique,  
2005 à 2015  
RLS de Caniapiscau et Côte-Nord  
(n)**



**Source(s) de données :**

- Système « Eau potable », ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).  
Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.


**Faits saillants**

- Dans le RLS de Caniapiscau, aucun avis d'ébullition de l'eau potable n'a été enregistré pour les années 2005, 2006, 2007 et 2011.
- Le nombre le plus élevé d'avis d'ébullition de l'eau potable par contamination microbiologique enregistré dans le RLS de Caniapiscau est de 4 avis en 2009, 2012 et 2014 (Côte-Nord : 71 avis en 2013).

## 5. Habitudes de vie, facteurs de risque et comportements préventifs

### Facteurs de risque à la naissance

**Proportion de naissances vivantes prématurées<sup>6</sup>, 2010-2014,  
proportion de naissances vivantes de faible poids<sup>7</sup>, 2010-2014  
et taux de mortalité infantile<sup>8</sup>, 2009-2013  
RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec  
(% et taux annuel moyen pour 1 000 naissances vivantes)**



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

#### Sources de données :

- MSSS. Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.
- MSSS. Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

### Faits saillants

- La proportion de naissances prématurées et d'enfants de faible poids dans le RLS de Caniapiscou se compare à celle du reste de la Côte-Nord et du Québec (voir figure). Les données sur le taux de mortalité infantile dans ce RLS sont trop imprécises pour être présentées et analysées.


<sup>6</sup> Naissance vivante prématurée : Moins de 37 semaines de gestation.

<sup>7</sup> Naissance vivante de faible poids : Inférieur à 2 500 grammes.

<sup>8</sup> Mortalité infantile : Décès de l'enfant de moins d'un an.

## Habitudes de vie : Alcool et tabagisme

### Proportion de la population (18 ans ou plus) selon certains facteurs de risque pour la santé liés à des habitudes de vie, alcool<sup>9 10</sup> (2010) et tabagisme (2014-2015) RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec (%)



(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑ : Valeur significativement plus élevée que celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %.

#### Sources de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015. Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

- Enquête Santé Côte-Nord 2010. Direction de santé publique de la Côte-Nord.

## Faits saillants


- En 2014-2015, environ 22 % de la population du RLS de Caniapiscou fume la cigarette de façon régulière ou occasionnelle, proportion similaire à celle du reste de la région (23 %) et du Québec (19 %).
- La consommation excessive d'alcool dans le RLS de Caniapiscou (2010) est significativement plus élevée que dans le reste de la région (39 % c. 28 %).

<sup>9</sup> Population vivant en ménage privé, à l'exclusion des résidents des communautés autochtones.

<sup>10</sup> La consommation excessive d'alcool représente la prise de cinq verres ou plus d'alcool, en une même occasion, au moins une fois par mois, dans l'année précédant l'enquête.

## Habitudes de vie : Activité physique

### Répartition de la population (15 ans et plus) selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport au cours des 4 dernières semaines<sup>11</sup>, 2014-2015 RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec (%)



\* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(+) Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(-) Valeur significativement moins élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑ Valeur significativement plus élevée que celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %.

↓ Valeur significativement moins élevée que celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %.

#### Source de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015. Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.


Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

## Faits saillants

- La population de 15 ans et plus du RLS de Caniapiscau est significativement plus nombreuse à être « active » et moins « sédentaire » que la population du reste de la région et du Québec au cours des 4 dernières semaines (actif : 49 % c. 39 % et 41 %, sédentaire : 23 % c. 34 % et 30 %).

<sup>11</sup> Pour connaître la définition des différents niveaux d'activité physique de loisir et de transport (actif, moyennement actif, peu actif et sédentaire), voir Fiche descriptive EQSP : 19.1 (Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport au cours des 4 dernières semaines, 2014-2015).

## Répartition de la population de 18 ans ou plus selon le statut pondéral<sup>12</sup> 2014-2015 RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec (%)



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(-) : Valeur significativement moins élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %

### Source(s) de données :

- Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015. Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

### Faits saillants

- Dans le RLS de Caniapiscou et dans la région nord-côtière, on retrouve proportionnellement plus de personnes obèses que dans le reste de la province (24 % et 26 % c. 19 %).
- Les résidents de ce RLS et de la Côte-Nord sont moins nombreux à avoir un poids normal que la population du reste du Québec (37 % et 34 % c. 43 %).

<sup>12</sup> Poids insuffisant = Indice de masse corporel (IMC) inférieur à 18,5 kg/m<sup>2</sup>.


Poids normal = Indice de masse corporel (IMC) égal ou supérieur à 18,5 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 25 kg/m<sup>2</sup>.

Embonpoint = Indice de masse corporel (IMC) égal ou supérieur à 25,0 kg/m<sup>2</sup> et inférieur 30,0 kg/m<sup>2</sup>.

Obésité = Indice de masse corporel (IMC) égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup>.

## Approche École en santé (AÉS)

### Pourcentage d'écoles qui implantent l'Approche École en santé (AÉS), 2011-2012 à 2016-2017 RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et ensemble du Québec (%)




Source(s) de données :  
- CISSS de la Côte-Nord. 2017.

### Faits saillants

- L'implantation de l'Approche École en santé dans les écoles du RLS de Caniapiscau a connu son envol en 2013-2014 (67 %) pour atteindre 100 % des écoles en 2014-2015 et 2015-2016. Cependant, une baisse a été recensée en 2016-2017 (66,7 %).

## 6. État de santé global

### Espérance de vie à la naissance, 2010-2014 RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec (Âge moyen en année)



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(-) : Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

#### Source(s) de données :

- MSSS. Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.
  - MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mai 2017).
  - MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.


#### Faits saillants

- Les données sur l'espérance de vie de la population du RLS de Caniapiscau sont trop imprécises pour être présentées et analysées.
- En Côte-nord, les hommes, les femmes ainsi que l'ensemble de la population de la région ont une espérance de vie proportionnellement inférieure à celle de leurs vis-à-vis du reste du Québec (hommes : 78 ans c. 80 ans, femmes : 83 ans c. 84 ans et sexes réunis : 81 ans c. 82 ans).

## 7. État de santé physique

### Prévalence et incidence des problèmes de santé

#### Prévalence de l'hypertension artérielle chez la population de 20 ans et plus selon le sexe, 2014-2015 RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec (%)



(+ +) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

(- -) : Valeur significativement plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

↓ ↓ : Valeur significativement plus faible que celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %.

**Source(s) de données :**


- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

### Faits saillants

- Dans le RLS de Caniapiscou, la prévalence de l'hypertension artérielle chez les hommes et chez l'ensemble de la population (sexes réunis) est proportionnellement plus faible que celle de leurs vis-à-vis du reste de la région et du Québec (hommes : 15 % c. 22 % et 21 %, sexes réunis : 16 % c. 21 % et 20 %).
- Les résidents de la Côte-Nord affichent une proportion plus élevée de personnes atteintes d'hypertension que la population du reste de la province (hommes : 22 % c. 21 %, femmes : 21 % c. 19 % et sexes réunis : 21 % c. 20 %).

**Taux d'incidence de l'hypertension artérielle chez les personnes de 20 ans et plus  
selon le sexe, 2014-2015  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Taux pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+ +) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

**Source(s) de données :**


- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Les données sur l'incidence de l'hypertension artérielle chez la population du RLS de Caniapiscau sont trop imprécises pour être présentées et analysées.
- Le taux d'incidence de l'hypertension artérielle chez les hommes, les femmes et chez l'ensemble de la population de la Côte-Nord (sexes réunis) est statistiquement supérieur à leurs vis-à-vis du reste de la province (hommes : 22 c. 18 pour 1 000 personnes, femmes : 18 c. 15 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 20 c. 16 pour 1 000 personnes).

**Prévalence du diabète chez les personnes de 20 ans et plus  
selon le sexe, 2014-2015  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(%)**



(+ +) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

**Source(s) de données :**


- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Dans le RLS de Caniapiscau, les femmes et l'ensemble de la population (sexes réunis) sont proportionnellement plus nombreux à être atteints de diabète que les autres Québécoises et l'ensemble de la population du reste du Québec (femmes : 13 % c. 7 % et sexes réunis : 11 % c. 8 %).
- Le taux de prévalence du diabète sur la Côte-Nord est significativement plus élevé que celui du reste du Québec (hommes : 10 % c. 9 %, femmes : 9 % c. 7 % et sexes réunis : 10 % c. 8 %).

**Taux d'incidence du diabète chez les personnes de 20 ans et plus  
selon le sexe, 2014-2015  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Taux pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+ +) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

**Source(s) de données :**


- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Les données sur l'incidence du diabète chez la population du RLS de Caniapiscau sont trop imprécises pour être présentées et analysées.
- Le taux d'incidence du diabète chez les femmes et chez l'ensemble de la population (sexes réunis) de la Côte-Nord est statistiquement supérieur à leurs vis-à-vis du reste de la province (femmes : 6 c. 5 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 7 c. 6 pour 1 000 personnes).

**Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)  
pour la population de 35 ans et plus selon le sexe, 2014-2015  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(%)**



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(+ +) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

**Source(s) de données :**


- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2014 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le nombre de personnes de 35 ans et plus atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) dans le RLS de Caniapiscau (hommes, femmes et sexes réunis) se compare à celui de la population du reste de la région et du Québec (hommes : 8 % et 10 % c. 9 %, femmes : 10 % et 9 % c. 8 % et sexes réunis : 9 % et 9 % c. 8 %).
- En Côte-Nord, le taux de prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est supérieur à celui du reste du Québec (hommes : 10 % c. 9 %, femmes : 9 % c. 8 % et sexes réunis : 9 % c. 8 %).

**Taux d'incidence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)  
pour la population de 35 ans et plus selon le sexe, 2014-2015  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Taux pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+ +) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

**Source(s) de données :**


- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), actualisation découpage territorial version M34-2014 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Les données sur l'incidence de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez la population de 35 ans du RLS de Caniapiscau sont trop imprécises pour être présentées et analysées.
- On recense un nombre statistiquement plus important de nouveaux cas de MPOC sur la Côte-Nord que dans le reste du Québec (hommes : 10 c. 7 pour 1 000 personnes, femmes : 8 c. 6 pour 1 000 personnes, sexes réunis : 9 c. 7 pour 1 000 personnes).

**Prévalence pour tous les cancers excluant ceux de la peau autres que le mélanome  
selon le sexe, 2011  
(basée sur le nombre de cancers primaires, 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Prévalence annuelle pour 1 000 personnes)**



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.


**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.
  - MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- La prévalence de l'ensemble des cancers chez les hommes et chez l'ensemble de la population du RLS de Caniapiscau (sexes réunis) se compare à leurs vis-à-vis du reste de la Côte-Nord et du Québec (hommes : 30 c. 20 et 16 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 21 c. 18 et 16 pour 1 000 personnes).
- En Côte-Nord, la prévalence pour l'ensemble des cancers, excluant ceux de la peau autres que le mélanome, est proportionnellement plus élevée que chez la population du reste de la province (hommes : 20 c. 16 pour 1 000 personnes, femmes : 17 c. 15 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 18 c. 16 pour 1 000 personnes).

**Taux d'incidence pour tous les cancers excluant ceux de la peau autres que le mélanome  
selon le sexe, 2011  
(basé sur le nombre de cancers primaires, 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Taux annuel moyen pour 1 000 personnes)**



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.


**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.
  - MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux d'incidence pour l'ensemble des cancers chez les hommes et chez l'ensemble de la population du RLS de Caniapiscau (sexes réunis) se compare à leurs vis-à-vis du reste de la Côte-Nord et du Québec (hommes : 10 c. 8 et 7 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 8 c. 7 et 6 pour 1 000 personnes).
- Le taux de nouveaux cas de cancer chez les hommes, les femmes et chez l'ensemble de la population de la Côte-Nord (sexes réunis) est significativement supérieur à celui de la population du reste de la province pour les mêmes catégories (hommes : 8 c. 7 pour 1 000 personnes, femmes : 6 c. 5 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 7 c. 6 pour 1 000 personnes).

**Prévalence pour le cancer du poumon selon le sexe, 2011  
(basée sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Prévalence annuelle pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.


- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux de prévalence du cancer du poumon sur le territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- La population de la Côte-Nord (hommes, femmes et sexes réunis) est plus nombreuse, en proportion, à être atteinte du cancer du poumon que la population du reste du Québec (hommes : 2 c. 1 pour 1 000 personnes, femmes : 2 c. 1 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 2 c. 1 pour 1 000 personnes).

**Taux d'incidence pour le cancer du poumon selon le sexe, 2011**  
 (basé sur le nombre de cancer primaire 2006-2010)  
**RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec**  
 (Taux annuel moyen pour 1 000 personnes)



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.


**Source(s) de données :**

- MSSS, Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.
  - MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 ; version avril 2012, 1996-2036 ; version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.
- Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux d'incidence du cancer du poumon sur le territoire de Caniapiscou est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- Le taux de nouveaux cas de cancer du poumon chez les hommes, les femmes et chez l'ensemble de la population de la Côte-Nord est proportionnellement plus élevé que celui de leurs vis-à-vis du reste du Québec (hommes : 2 c. 1 pour 1 000 personnes, femmes : 1 c. 1 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 1 c. 1 pour 1 000 personnes).

**Prévalence pour le cancer du côlon selon le sexe, 2011  
(basée sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Prévalence annuelle pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

**Source(s) de données :**


- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.
- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux de prévalence du cancer du côlon sur le territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- La région nord-côtière ne se démarque pas du reste du Québec quant à la prévalence du cancer du côlon (hommes : 2 c. 2 pour 1 000 personnes, femmes : 2 c. 1 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 2 c. 1 pour 1 000 personnes).

**Taux d'incidence pour le cancer du côlon selon le sexe, 2011  
(basé sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscou, Côte-Nord et Québec  
(Taux annuel moyen pour 1 000 personnes)**



\*\* n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

**Source(s) de données :**


- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;
- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux d'incidence du cancer du côlon sur le territoire de Caniapiscou est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- En Côte-Nord, le taux d'incidence du cancer du côlon chez les hommes, les femmes et chez l'ensemble de la population (sexes réunis) se compare à celui de leurs vis-à-vis du reste de la province (hommes : 1 c. 1 pour 1 000 personnes, femmes : 1 c. 1 pour 1 000 personnes et sexes réunis : 1 c. 1 pour 1 000 personnes).

**Prévalence du cancer de la prostate chez l'homme, 2011  
(basée sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Prévalence annuelle pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.


- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux de prévalence du cancer de la prostate chez les hommes résidant sur le territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- La Côte-Nord se distingue du reste du Québec par un nombre plus élevé d'hommes atteints du cancer de la prostate (7 c. 5 pour 1 000 hommes).

**Taux d'incidence pour le cancer de la prostate chez l'homme, 2011  
(basé sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Taux annuel moyen pour 1 000 personnes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.


- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux de nouveaux cas de cancer de la prostate chez les hommes du territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- L'incidence du cancer de la prostate chez les hommes de la Côte-Nord est plus élevée, en proportion, que chez les hommes du reste du Québec (2 c. 1 pour 1 000 hommes).

**Prévalence du cancer du sein chez la femme, 2011  
(basée sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Prévalence annuelle pour 1 000 femmes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

**Source(s) de données :**


- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.
- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux de prévalence du cancer du sein chez les femmes qui résident sur le territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- Les femmes de la région nord-côtière se comparent, en proportion, au reste du Québec quant au nombre de femmes atteintes du cancer du sein (5 c. 6 pour 1 000 femmes).

**Taux d'incidence pour le cancer du sein chez la femme, 2011  
(basé sur le nombre de cancers primaires 2006-2010)  
RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec  
(Taux annuel moyen pour 1 000 femmes)**



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

**Source(s) de données :**

- MSSS. Fichier des tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015.
- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mars 2015) selon la table de correspondance des territoires 2014-2015 de la version M34-2014.


Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Faits saillants**

- Le taux d'incidence du cancer du sein chez les femmes qui résident sur le territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- Le taux de nouveaux cas du cancer du sein chez les femmes de la Côte-Nord se compare à celui des Québécoises du reste de la province (1 c.1 pour 1 000 femmes).

## Mortalité selon les principales causes

### Taux de mortalité selon les principales causes, 2010-2014 RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec (Taux annuel moyen par 100 000 personnes)



\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(-) : Valeur significativement plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

#### Source(s) de données :

- MSSS. Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.
- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mai 2017).

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.


## Faits saillants

- Le taux de mortalité selon les principales causes dans le RLS de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- Mentionnons que, dans le RLS de Caniapiscau, les principales causes de décès sont le cancer (24 %), les maladies du cœur (12 %), les traumatismes non intentionnels (12 %), le diabète sucré (7 %) et les maladies des voies respiratoires inférieures (7 %) (données non présentées)<sup>13</sup>.
- Les résidents de la région sont proportionnellement plus nombreux à décéder de tumeurs malignes et de maladie de l'appareil respiratoire que le reste de la population québécoise (293 c. 248 et 84 c. 72 pour 100 000 personnes).

<sup>13</sup> Taux annuel moyen, 2009-2013. MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2016 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015. Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

## Années potentielles de vie perdues à 75 ans

### Taux des années potentielles de vie perdues à 75 ans pour certaines maladies chroniques, 2010-2014 RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec (Taux annuel moyen pour 100 000 personnes)



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

#### Source(s) de données :

- MSSS. Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.
- MSSS. Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mai 2017).


Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

## Faits saillants

- Le taux des années potentielles de vie perdues chez la population du RLS de Caniapiscau pour les maladies de l'appareil circulatoire, respiratoire, digestif et les tumeurs malignes (excluant les cancers de la peau sans mélanome) est trop imprécis pour être présenté et analysé.
- Le taux annuel moyen de Nord-Côtiers décédés par maladie de l'appareil respiratoire ou de tumeur maligne, excluant les cancers de la peau sans mélanome, est statistiquement supérieur à celui de la population du reste du Québec (277 c. 182 pour 100 000 personnes et 1 891 c. 1 658 pour 100 000 personnes).

## Hospitalisation et mortalité pour traumatismes non intentionnels

### Taux d'hospitalisation en soins de courte durée pour traumatismes non intentionnels (avril 2012 à mars 2017) et taux de mortalité par traumatismes non intentionnels (2010-2014) RLS de Caniapiscau, Côte-Nord et Québec (Taux annuel moyen pour 10 000 personnes)



\* : Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\*n.p. : Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur de la proportion est non présentée en raison de son imprécision trop élevée.

(+) : Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑ : Valeur significativement plus élevée que celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %.

#### Source(s) de données :

- MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017.

- Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé, actualisation découpage territorial version M34-2017.

- MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2036 : version mai 2017).

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec.

#### Faits saillants

- Le taux d'hospitalisation en soins de courte durée pour traumatismes non intentionnels sur le territoire du RLS de Caniapiscau est statistiquement supérieur à celui du reste de la Côte-Nord et du Québec (136 c. 54 et 50 pour 10 000 personnes). En Côte-Nord, le taux est également supérieur à celui du reste du Québec (54 c. 50 pour 10 000 personnes).
- Le taux de mortalité par traumatismes non intentionnels sur le territoire de Caniapiscau est trop imprécis pour être présenté et analysé. Dans la région, ce taux est proportionnellement plus élevé que celui du reste de la province (4 c. 3 par 10 000 personnes).